

Estem a la tardor, tornem-hi amb els bolets!

Totes les èpoques de l'any tenen el seu encant, però és la tardor, amb les seves harmonioses tonalitats ocre dels arbres caducifolis, la que ens porta els bolets.

És doncs, en aquesta estació que tradicionalment la Secció de Cultura de l'Agrupació Excursionista Talaia, amb l'estimable col·laboració de la Societat Catalana de Micologia, organitza la Mostra de Bolets que aquest any és la tretzena, es celebra durant els dies 19 i 20 de novembre.

En aquestes mostres es poden veure tant els bolets trobats a la nostra comarca com diferents espècies d'altres indrets de Catalunya.

És freqüent poder observar el carlet (*Hebeloma edurum*), apreciat a Vilanova i la seva rogalia, però rebutjat en altres llocs, el garlandí (*Tricholoma caligatum*), de perfum oriental fàcil de reconèixer pel seu anell ascendent que divideix el peu en dues zones de colors diferents i barret amb esquames brunenques, comestible apreciat en algunes zones, però la seva carn amarganteja; el morro d'ovella (*Tricholoma terreum*), excel·lent comestible; la llenega (*Higrophorus limacinus*), molt apreciada; la llèmna (*Hydnum repandum*), de color groc pàl·lid amb l'himeni amb agulletes; el rovelló (*Lactarius deliciosus*), no cal que esmentem que és

una de les espècies més apreciades a Catalunya; el rossinyol (*Cantharellus cibarius*), d'himeni amb plecs i excel·lent comestible; la farinera (*Amanita ovoidea*), comestible, però que hem de rebutjar perquè es pot confondre amb les amanites blanques mortals. Fa dos anys poguérem admirar-ne a la Mostra exemplars

l'interior per una gleba verda que desprèn una forta olor i atrau les mosques, i el pixaconill (*Hygrocybe conica*), de mida petita amb un barret vermell, làmines blanques i peu prim.

En cada Mostra s'intenta portar la farinera borda (*Amanita phalloides*), bolet sovint gran, amb el barret verd olivaci i amb les làmines, anell, peu i volva de color blanc. És tòxic mortal, i el fet d'aparèixer als boscos a la meitat de la tardor, en plena temporada, la fa més perillosa.

Només un any hem gaudit de la presència del reig bord o reig foll (*Amanita muscaria*), el més bonic dels bolets, representat habitualment en molts contes infantils, amb el barret de color vermell, amb restes de berregues blanques i làmines, anell, peu i volva de color blanc.

És tòxic i provoca trastorns a l'aparell digestiu, sovint acompanyat d'altres del sistema nerviós, amb al·lucinacions.

I clourem la sèrie de bolets amb l'espectacular apagallums (*Macrolepiota procera*), de dimensions considerables, amb anell mòbil al peu i comestible quan és jove.

Encara que malauradament hi ha una gran part dels boscos del nostre país arrasats pel foc, esperem poder gaudir de la 13a Mostra de Bolets amb nombroses espècies diferents.



Mostra de bolets. (Foto:Farriol)

que pesaven aproximadament 500 g. Es caracteritza per una gran volva marronosa i per la seva carn blanca que deixa els dits amb una lleugera polsina d'aquest color, d'aquí li ve el nom popular.

Altres anys també han estat exposats el camperol (*Agaricus campester*), comestible de bona qualitat; la gita de bruixa (*Clathrus ruber*), format per un enreixat vermell recobert a